

لقاحات المكورات السحائية للمراهقين ومرحلة ما قبل المراهقة

تساعد لقاحات المكورات السحائية على الحماية من البكتيريا المسببة لمرض المكورات السحائية. تعتبر لقاحات المكورات السحائية أفضل وسيلة لحماية المراهقين من الإصابة بمرض المكورات السحائية

النوعان الأكثر شيوعًا من الأمراض يشملان عدوى ما يلي:




تيار الدم

بطانة الدماغ والحبل الشوكي
(التهاب السحايا)



وحتى مع العلاج، فإن حوالي **10** إلى **15** من كل **100** شخص مصاب بمرض المكورات السحائية سيموتون بسببه.



- ✓ يجب أن يحصل جميع المراهقين على جرعتين من لقاح المكورات السحائية (MenACWY).
- ✓ يجب أن يحصلوا على الجرعة الأولى في عمر **11-12** عامًا وجرعة معززة في عمر **16** عامًا.

العمر 16

قبل دخول الصف الثاني عشر



الأعمار 11-12

قبل دخول الصف السابع



- يتعين تناول جرعتين من لقاح MenACWY للالتحاق/الدخول إلى المدرسة.
- يوصى بتناول جرعتين من لقاح المكورات السحائية (MenB) بعد عمر 16 عامًا.

طويل الأمد



فعال



آمن



يرجى التحدث مع مقدم الرعاية الصحية لطفلك اليوم حول الحصول على التطعيم ضد مرض المكورات السحائية.

[/https://www.vdh.virginia.gov/immunization/requirements](https://www.vdh.virginia.gov/immunization/requirements)