

كيف يكون الشعور عند تلقي تطعيم كوفيد-١٩

سوف يساعد تلقي التطعيم على حمايتك من الإصابة بكوفيد-١٩ أو سيساعد في تقليل حدة المرض. كلما زاد عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم، زادت الحماية لكل فرد في المجتمع.

الآثار الجانبية

[قد تختلف من شخص لآخر]

أظهرت التجارب السريرية أن الآثار الجانبية الشائعة تشمل:

- ✓ ألم في موقع الحقن
- ✓ إرهاق
- ✓ ألم في الرأس
- ✓ آلام العضلات
- ✓ آلام المفاصل
- ✓ قشعريرة
- ✓ حمى



ماذا يحدث عندما يحصل شخص ما

على لقاح كوفيد-١٩

• سيتم إعطاء التطعيم من قبل أخصائي الرعاية الصحية. وهناك حاليًا عدد قليل من اللقاحات التي تمت الموافقة عليها.



• يتم إعطاء التطعيم في الذراع. قد يحدث وجع واحمرار وألم في منطقة الحقن.



• معظم الآثار الجانبية قصيرة المدى خفيفة وسوف تزول في غضون يومين.



• الآثار الجانبية هي إشارة أن جهاز المناعة في جسمك يعمل على تعزيز الحماية من كوفيد-١٩.



كل شخص يستجيب بشكل مختلف عند تلقي اللقاح. من الجدير بالذكر أنه يجب أن تثبت دراسات لقاحات كوفيد-١٩ أنها آمنة وفعالة قبل الموافقة على استخدام أي لقاح.



VDH VIRGINIA
DEPARTMENT
OF HEALTH

لمزيد من المعلومات حول كيفية صنع اللقاحات واختبارها وتوزيعها،
تفضل بزيارة vdh.virginia.gov/covid-19-vaccine
أو اتصل بالرقم 877-ASK-VDH3