

COVID-19 백신 접종 후에 증상이 나타나면 어떻게 해야 하나요



중증 알러지 반응

COVID-19 백신 접종 후 중증 알러지 반응이 나타나는 것은 드문 일입니다. 이럴 경우 즉각적으로 치료를 해야 합니다. 백신 접종 장소를 떠난 후 중증 알러지 반응이 있는 것 같다고 판단될 경우 9-1-1로 전화하십시오. 중증 알러지 반응에는 다음과 같은 증상들이 있습니다:

- 목구멍이 닫히는 듯한 느낌
- 혈떡거림 또는 숨가쁨
- 메스꺼움, 구토, 설사
- 현기증 또는 실신
- 빠른 심장박동
- 입술, 얼굴, 목구멍의 두드러기, 간지러움, 부어오름



흔히 나타나는 부작용

백신 접종 후 며칠간 경미한 부작용이 나타날 수 있으며, 이는 우리의 몸이 보호 능력을 만들어내고 있다는 의미입니다. 경미한 부작용에는 다음과 같은 증상들이 있습니다:

- 주사를 맞은 팔의 붉어짐, 통증, 부어오름
- 미열, 오한, 두통, 피로

이러한 부작용은 며칠 후 사라질 것입니다. CDC에 부작용에 대해 알리기 위해서는 [vsafe.cdc.gov](https://www.vsafe.cdc.gov)에서 안전한 스마트폰 톨에 무료로 등록할 수 있습니다. 당신이 겪고 있는 부작용이 우려될 경우 의료인에게 문의하십시오.

COVID-19 증상

- 발열, 기침, 호흡곤란, 인후통, 미각이나 후각의 상실과 같은 COVID-19 증상이 나타날 경우, 집에 머물면서 의료인에게 연락하십시오.
- 이러한 증상들 중 발열을 제외한 나머지는 백신으로 인해 나타날 수 있는 부작용에 해당하지 않습니다.
- 백신 접종 이전에 COVID-19에 노출되어 이제서야 증상이 나타나고 있는 것일 수 있습니다. **백신 접종으로는 COVID-19에 걸리지 않습니다.**

백신을 접종하는 장소에서는 즉각적으로 알러지 반응을 보이는 사람들을 도울 준비가 되어 있습니다. 백신 접종 이후 최소 15분 동안 백신 접종 장소에 머무르십시오. 백신 접종 장소를 떠난 뒤 중증 알러지 반응이 나타날 경우 9-1-1로 전화하거나 가까운 병원으로 가십시오.

