

# 您需要哪些疫苗？

## 猴痘和/或艾滋病毒感染风险人群推荐疫苗



疫苗	关于此疫苗	接种对象	接种原因	接种时间	接种地点
流感疫苗	一种可预防常见流感病毒的疫苗。	年龄在 6 个月及以上的所有人群。 某些儿童可能需要接种多剂。	它可以帮助预防疾病、减少住院和死亡概率。 对于患流感的人来说，它可以减轻病情的严重程度。	每年。九月和十月是接种流感疫苗的最佳月份。	卫生部门、药店和医疗办公室。 如需具体位置，请访问 <a href="http://vaccinate.virginia.gov">vaccinate.virginia.gov</a>
新冠肺炎疫苗	一种可预防新冠病毒变种的疫苗，这种病毒预计将成为常见病毒。	<ul style="list-style-type: none"> <li>年龄在 6 个月及以上的所有人群。</li> <li>可能建议某些人（儿童、免疫系统较弱的人、老年人）接种多剂。</li> </ul>	它可以帮助预防严重疾病、降低住院和死亡概率。 它还可能降低出现新冠肺炎长期症状的风险。	升级版新冠肺炎疫苗上市（通常在秋季）。 如果您最近感染了新冠肺炎，您可能具有因感染而形成的免疫力，可以考虑在感染后三个月再接种疫苗。	卫生部门、药店和医疗办公室。 如需具体位置，请访问 <a href="http://vaccinate.virginia.gov">vaccinate.virginia.gov</a>
猴痘疫苗	预防猴痘的两剂疫苗。	<ul style="list-style-type: none"> <li>与猴痘患者有过密切接触的人士。</li> <li>可能会感染猴痘的风险人士。</li> </ul> <i>感染猴痘且康复的人群，无需接种猴痘疫苗。</i>	它可以帮助预防严重疾病、降低住院和死亡概率。 对于猴痘感染人群来说，它可以减轻病情的严重程度。	如果您符合接种条件，建议尽快接种。同时接种两剂疫苗可获得最佳保护。 无论现在离您接种第一剂疫苗已经过了多久，仍可接种第二剂疫苗。	大多数卫生部门和一些医疗办公室。 可在以下网站查找位置 <a href="http://mpoxvaccine.cdc.gov">mpoxvaccine.cdc.gov</a>
脑膜炎球菌疫苗	一种有助于预防脑膜炎球菌疾病的疫苗。 每种疫苗类型为两剂。 一些处于特定风险因素中的人群可能需要接种更多剂次。	所有学龄前儿童、青少年和有某些特定健康状况（如艾滋病毒）的人。	它可以帮助预防可引起脑膜炎的脑膜炎球菌感染（大脑和脊髓内膜肿胀）或败血症（血流感染）。	如果您符合条件且未接种脑膜炎球菌疫苗，请立即接种。按推荐剂次接种，可获得最佳保护。	大多数卫生部门、药店和医疗办公室。
其他疫苗	根据您的年龄、健康状况或其他因素，您可能还需要接种其他疫苗，如呼吸道合胞病毒 (RSV) 疫苗或肺炎球菌疫苗。请咨询您的医疗保健提供者，询问哪些疫苗适合您。				

### 了解更多信息

流感与新冠肺炎：[vdh.virginia.gov/respiratory-diseases](http://vdh.virginia.gov/respiratory-diseases)

猴痘：[vdh.virginia.gov/mpox](http://vdh.virginia.gov/mpox)

脑膜炎球菌：[vdh.virginia.gov/surveillance-and-investigation/meningococcal-disease-outbreak-response](http://vdh.virginia.gov/surveillance-and-investigation/meningococcal-disease-outbreak-response)

在许多情况下，这些疫苗可以同时接种。但是，我们建议计划同时接种猴痘和新冠肺炎疫苗的青少年或年轻成年男性，两种疫苗接种需间隔四周。如果您对任何免疫接种有疑问，请咨询医疗保健提供者或药剂师。如果您没有医疗保健提供者，请在 [vdh.virginia.gov/health-department-locator](http://vdh.virginia.gov/health-department-locator) 上查找当地的卫生部门，并与他们交谈。