

¿CÓMO USAR LAS TIRAS REACTIVAS PARA LA DETECCIÓN DE FENTANILO, XILACINA Y BENZODIAZEPINAS?



IMPORTANTE:

- Las tiras reactivas sólo pueden indicarle si la droga que está analizando se encuentra en su suministro. Las drogas que consume pueden contener otras drogas o sustancias que no serán detectadas por la tira reactiva. Siempre es mejor hacer una inyección de prueba e ir despacio cuando se inyecte.
- Muchas tiras reactivas sólo detectan la presencia de un tipo de droga. Por ejemplo, una tira reactiva de fentanilo sólo detecta fentanilo, y no proporciona información sobre la presencia de otros tipos de drogas como xilacina y benzodiazepinas.

LO QUE NECESITA PARA DETECTAR DROGAS EN SU SUMINISTRO



Tira reactiva
Cucharadita de agua (5 mL)



Jeringuilla vacía
Recipiente

CÓMO USAR LAS TIRAS REACTIVAS EN DROGAS INYECTABLES:

1. Prepare la droga que piensa consumir en un recipiente limpio y seco y luego colóquela en una jeringuilla. **NO se inyecte todavía.** Deje la jeringuilla cargada a un lado y agregue 5 mL de agua al recipiente.
2. Revuelva la mezcla.
3. Tome la tira reactiva por el extremo azul y sumérgjala en el líquido con el residuo sin sobrepasar la línea azul. Mantenga la tira en la solución durante 15 segundos.
4. Coloque la tira reactiva sobre una superficie plana durante un minuto completo.
5. Compruebe el resultado de la tira reactiva.
6. Deseche el recipiente y el líquido restante. El líquido restante es ahora tóxico.



No utilice tiras reactivas de xilacina en sustancias que contengan cocaína. No obtendrá una lectura precisa.

CÓMO USAR LAS TIRAS REACTIVAS EN DROGAS QUE SE INHALAN:

1. Vacíe la bolsita con la droga en polvo sobre la mesa. La bolsita debe tener residuo de droga en los lados (polvo residual).
2. Añada 5mL de agua a la bolsita vacía y revuelva para disolver el polvo residual.
3. Tome la tira reactiva por el extremo azul y sumérgjala en el líquido con el residuo sin sobrepasar la línea azul. Mantenga la tira en la solución durante 15 segundos.
4. Coloque la tira reactiva sobre una superficie limpia durante un minuto completo para el fentanilo y cinco minutos completos para la xilacina y las benzodiazepinas.
5. Compruebe los resultados de la tira reactiva.
6. Deseche la bolsita con la solución.

Si la droga de su elección viene en comprimidos, triture los mismos y mezcle bien. Si la droga viene en cápsulas, abra las cápsulas y mézclelas bien. El fentanilo se apelmaza o amontona y mezclarlo bien garantiza los mejores resultados de la detección. Luego siga las instrucciones para detectar fentanilo en drogas que se inhalan.

QUÉ SIGNIFICAN LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA:

 **Una línea roja**

- **Resultado positivo:** la prueba detectó fentanilo, xilacina o benzodiazepinas en la muestra de droga, según el tipo de tira reactiva utilizada.

 **Dos líneas rojas**

- **Resultado negativo:** la prueba no detectó fentanilo, xilacina o benzodiazepinas en la muestra de droga, según el tipo de tira reactiva utilizada. **PRECAUCIÓN:** Las tiras reactivas sólo detectan la presencia de un tipo de droga. Por ejemplo, una muestra con resultado negativo para fentanilo puede contener otra droga.

 **Ninguna línea roja**

- La prueba **no es válida**

 **Ninguna línea de control**

- La prueba **no es válida**

RECURSOS Y EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD



ENLACE AL SITIO WEB DEL FABRICANTE

<https://www.btnx.com/HarmReduction>

Obtenga más información sobre cómo utilizar las tiras reactivas para detectar la presencia de fentanilo en una sustancia.



ENLACE AL SITIO WEB DE REDUCCIÓN INTEGRAL DE DAÑOS DE VDH

<https://www.vdh.virginia.gov/disease-prevention/chr/>

La Reducción Integral de Daños es un conjunto de servicios de salud pública de VDH diseñados para reducir el impacto negativo del consumo de drogas. También, ayuda a prevenir el VIH (virus de la inmunodeficiencia humana), la hepatitis C, otras infecciones, las sobredosis y la muerte. Está dirigido a quienes no pueden o no están preparados para dejar de consumir drogas.



NÚMERO DE LA LÍNEA DIRECTA NEVER USE ALONE

877-696-1996

Never Use Alone es una línea gratuita de ayuda confidencial y libre de juicios para personas que consumen drogas estando solas. Le pedirán su nombre, dirección y el número telefónico. Un operador permanecerá en línea con usted mientras consume. Si deja de responder después de consumir, el operador avisará a los servicios de emergencia de que hay una “persona que no reacciona” en su ubicación.



NÚMERO DE LA LÍNEA NACIONAL DE AYUDA DE SAMHSA

1-800-622-HELP (4357)

La Línea Nacional de Ayuda de SAMHSA es un servicio confidencial, gratuito, disponible las 24 horas del día, los 365 días del año, en inglés y español, para personas y familias que enfrentan trastornos mentales o de uso de sustancias.

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD SOBRE EL USO DE LAS TIRAS REACTIVAS PARA LA DETECCIÓN DE CIERTAS DROGAS:

1. Cualquier persona que reciba tiras reactivas para la detección de sustancias que puedan agravar una sobredosis, incluyendo, pero no limitándose al fentanilo, la xilacina o las benzodiazepinas, acepta toda responsabilidad por cualquier daño, lesión o muerte que se produzca por el consumo de drogas, independientemente de si dichas drogas han sido analizadas con las tiras reactivas. VDH no garantiza ni asume responsabilidad alguna por la exactitud de las tiras reactivas ni por la manera en que el usuario las utilice.
2. Acepto indemnizar, defender y eximir de responsabilidad al Departamento de Salud de Virginia y a la Commonwealth de Virginia, así como a los funcionarios, agentes y empleados de los anteriores de todos los daños, reclamaciones y pérdidas que se acumulen o resulten para cualquier persona que se considere lesionada o dañada como resultado de actos u omisiones relacionados con las tiras reactivas.